

PROTOCOLE DE LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

Février : Sortie
des Fondatrices

Construction
Nid Primaire

Nid secondaire
Croissance

Avril-Mai-Juin

ARRÊT PIÉGEAGE
DES
FONDATRICES
FIN MAI

PIÉGEAGE DES
FONDATRICES
DES LEUR
APPARITION



SURVEILLANCE
DU RUCHER
ET RECHERCHE
DES NIDS

PRÉDATION
Juillet-Août-Septembre

Janvier-Février-Mars

Régression et mort
de la colonie de FA

SURVEILLANCE
DU RUCHER
PROTECTION
PRÉDATION

Nid secondaire
Reproduction

Décembre-Novembre-Octobre

PRÉDATION jusqu'à fin Octobre

Signaler la présence de Frelons Asiatiques ou d'un nid :

- soit à la plateforme régionale : www.frelonsasiatiques.fr
- soit au Référent Frelon Asiatique du secteur



PROTOCOLE DE LUTTE CONTRE LE FRELON ASIATIQUE

PROTÉGEONS NOS RUCHES

-

RESPECTONS LA BIODIVERSITÉ

Référents FA de mon secteur	tel	Adresse mail

❖ Piéger les FONDATRICES de FA au Printemps

1 - Modèles de pièges conseillés :

Pièges nasses.

2 - Appâts conseillés :

L'appât doit être sucré. Cocktail de Sirop de fruits rouges 1/3, de Bière 1/3, de Vin blanc ou rouge 1/3 et ajouter du jus de fonte des cires.

3 - Où piéger?

- Au rucher 1 à 2 pièges.
- Dans un rayon de 500m (10 pièges maximum régulièrement répartis), autour du rucher.
- Autour des nids connus de l'année précédente.
- Le piégeage est possible aussi près des cours d'eau, des composts, de zones à concentration d'insectes (arbres à fleurs type Camélia).
- Piège au soleil, position entre 0,50 à 1,5 m de hauteur, orientation du cône au sud.

4 - Quand?

Début, dès Février après 2 à 3 jours avec une température minimale de 12/13°C, ou dès l'observation de FA.

Fin, dès l'apparition de Frelon Européen, au plus tard fin Mai.

5 - Comment?

Mise en place des pièges et des appâts en fonction des conditions météo locales.

Si capture de FA, conserver quelques frelons morts dans le piège.

Chaque semaine : Relever le piège. Renouveler l'appât (+ adjonction de FA morts).

Faire l'inventaire des captures y compris des autres insectes, à chaque relevé de piège, en vue d'un retour d'information.

En cas de trop nombreuses prises d'insectes non ciblés, il sera utile de modifier le piège.

❖ Rechercher les nids Primaires et secondaires

<https://www.lesapiculteursdelain.fr/frelon-asiatique>

Contribution aux méthodes de recherche de nids (Ensemble contre le Frelon asiatique)



❖ Surveiller le rucher

Observer l'avant et l'arrière des ruches, pendant 10mn au moins et à différents moments de la journée.

❖ Protéger le rucher

Pour éloigner le FA de l'entrée de la ruche:

- **Avoir des ruches fortes**
- Utiliser des portes d'entrées adaptées (nouvelle porte Nicot grise par exemple), des muselières...
- Diminuer la pression du FA par piégeage, (pièges sélectifs), destruction des FA (harpes électriques)...
- En dernier recours, envisager le déménagement des ruches.

Retrouver plans et documentation sur le site

<https://www.lesapiculteursdelain.fr/le-coin-du-bricoleur>

