

ATTENTION à CES PLANTES INDESIRABLES

Berce du Caucase

- ◆ **Origine** Région du Caucase (Géorgie, Russie), introduite au XIX^e siècle pour ses qualités ornementales et mellifères.
- ◆ **Où la trouve-t-on ?** Présente dans un large quart Nord-Est et dans les Alpes, elle progresse vers le Sud-Ouest en bord de rivière, sur les talus et les friches.
- ◆ **Ses méfaits** Elle concurrence fortement les espèces indigènes. Sa sève, qui recèle des toxines (furanocoumarines), cause de fortes réactions allergiques, et même de graves brûlures.
- ◆ **Comment la reconnaître ?** Ses poils sont noirs, tandis que ceux de la berce commune indigène sont blancs. Ses feuilles sont découpées et pointues.
- ◆ **Quelle parade ?** Couper la racine entre 15 et 20 centimètres sous le niveau du sol au printemps. Bien laver les vêtements, les gants et les outils

ALLERGISANTE



Renouée du Japon

- ◆ **Origine** Introduite en Europe depuis l'Asie de l'Est vers 1820 pour ses qualités ornementales et mellifères.
- ◆ **Où la trouve-t-on ?** Dans les zones alluviales, sur les talus, les bords de route et les friches industrielles, en particulier dans le Nord-Ouest, l'Est et le Sud-Ouest.
- ◆ **Ses méfaits** Le feuillage très dense et précoce de cette plante prive les autres végétaux de la lumière. Elle favorise par ailleurs l'érosion des berges, et ses rhizomes endommagent les infrastructures.
- ◆ **Comment la reconnaître ?** Contrairement à ses cousines de Sakhaline et de Bohême, la renouée du Japon n'a aucun poil sur les nervures de la face inférieure de ses feuilles.
- ◆ **Quelle parade ?** Extraire ses rhizomes puis couvrir le sol d'une bâche afin d'éviter toute reprise

DESTRUCTRICE

